

verzió:

20171201

Fej-Nyak

Protokoll	Pajzsmirigy - natív
Indikáció	Substernalis struma kiterjedésének meghatározása
Előkészítés	

Kontrasztanyag

per os	
per rectim	
i.v.	
mennyiség (ml)	
sebesség (ml/s)	
Só mennyiség (ml)	
késleltetés (s)	
bolus tracking helye	

Mérések

Fázisok	Natív
Vizsgálendő terület	Mandibula aljától a tracheabifurkációig.

Rekonstrukciók,
képanyag

Felirat/label	Natív - Lágyrész	
Ablak	Lágyrész	
Szeletvastagság	2-3 mm	
Increment		
Irány	AXI+COR+SAG	
Kernel/Filter	Soft	
Típus	MPR	

Megjegyzés

VRT, MINIP rekonstrukciók segíthetnek trachea megítélésében
 Amennyiben tüdőgóc kerül leírásra 1-1,5 mm-es szeletvastagságú nagy felbontású sorozat készítése javasolt.

Irodalom

- Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT Images: From the Fleischner Society 2017 - Radiology: Volume 284: Number 1, July 2017
<http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2017161659>