

verzió:

20171201

Mellkas-Has-Kismedence			
Protokoll	Vese II/B. Tumor kontroll - kontraszt		
Indikáció	Vesetumor komplett rezekciója esetén (mellkas-has)		
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel		
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.		
	per os	1 liter víz 20-30 perc alatt	
	per rectim		
	i.v.	Késő Artériás	Nefrográfias (100 sec)
	mennyiség (ml)	100	
	sebesség (ml/s)	4-5	
	Só mennyiség (ml)	30-50	
	késleltetés (s)	+10	100
	bolus tracking helye	aorta	
Mérések			
	Fázisok	Késő Artériás	Nefrográfias
	Vizsgálandó terület	Has	a tüdőcsúcstól a symphysis aljáig
Rekonstrukciók, képanyag			
	Felirat/label	Artériás	Nefrográfias
	Ablak	Lágyrész	Lágyrész, tüdő
	Szeletvastagság	2-3 mm	2-3 mm
	Increment		
	Irány	AXI+ COR+SAG	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft	Soft
	Típus	MPR	MPR
Megjegyzés	1. A magas adagolási sebesség és a nagy mennyiségű kontrasztanyag adása egyaránt fontos.		
Irodalom			