

<b>OENO:</b>	31140
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Stenvers felvétel
<b>Indikáció:</b>	A sziklacsont állapotának megítélése.
<b>Blende határok:</b>	
<b>Anatómiai képletek:</b>	belső hallójárat, középfül képletei, antrum és proc. mastoideus, labyrinthus, pars petrosa ossis temporalis (a sziklacsont hosszában ábrázolódik)
<b>Képméret:</b>	13x18 cm
<b>FFT:</b>	60 cm
<b>Centrális sugár:</b>	12 fokkal caudo-cranialisan a filmközele MAE előtt 2,5 cm-rel lévő pontra irányul (kb. 5 cm-rel hátrébb az ellenoldali MAE-hoz képest) A CS. a kazetta közepére esik.
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A beteg hason fekszik. Fejet 45 fokban a vizsgált oldalra fordítjuk úgy, hogy homloka, orra, arca az asztalon támaszkodjon. A mediansagittalis sík az asztal középvonalában van. Légzésszünet.
<b>Felvételi követelmény:</b>	A teljes os temporale ábrázolódjon. A pars petrosa oldalnézetben torzítás nélkül látszódjon. A processus mastoideus oldalnézetben a koponya széle alatt ábrázolódjon. A belső hallójárat a sziklacsont alatt legyen. Külső hallójárat és a meatus acusticus externus látszódjon. A manibula condylusok és a felső szár a nyakcsigolyára vetüljenek. Összehasonlító felvételt készítünk minden esetben.
<b>Megjegyzés:</b>	A fej forgatása a koponya alakjától függően változhat. Ha rövid, tovább forgatjuk (kb. 54 fok), hosszú, keskeny esetén kevésbé forgatjuk a fejet (kb. 40 fok). Oldaljelzés, gonádvédelem.