

OENO:	31540
Protokoll (OENO megnevezés):	Lumbalis gerinc, AP felvétel
Indikáció:	Az ágyéki gerinc állapotának megítélése.
Blende határok:	Felső széle a processus xyphoideus, alsó széle a csípőtaréj alatt tenyérrel, oldalsó széle a gerinc mindkét oldalán 3-3 h. ujjal.
Anatómiai képletek:	Csigolyatestek, gyökök, tövis- és harántnyúlványok, csigolya közti rések.
Képméret:	20 × 40 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	Merőleges az L.IV. csigolyára (a fősugár a két csípőlapát legmagasabb pontját összekötő vonal felezőpontjának magasságában merőlegesen éri a filmet.)
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg a hátán fekszik. A test mediansagittalis síkja az asztal középvonalában van. A spina iliaca anterior superior összekötő képzeletbeli egyenes párhuzamos az asztallal. Lábat kissé felhúzza, talpa az asztalon. Kazetta közepe az L. IV. csigolya szintjében van.
Felvételi követelmény:	A lumbalis csigolyák elfordulás nélkül ábrázolódnak. Scoliosis esetén a felvételt álló helyzetben, állványnál készítjük. Th. XII. csigolya legyen benne a felvételben.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.