

OENO:	31606
Protokoll (OENO megnevezés):	Váll, axiális felvétel
Indikáció:	A vállizület állapotának megítélése. Luxatiók, törések tengelyeltérésének kimutatása.
Blende határok:	Felső szél a humerus proximális harmada, alsó szélé a scapula közepe, oldalt lágyrészhatárok.
Anatómiai képletek:	Glenohumeralis ízület, humerus proximalis vége.
Képméret:	18x24 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	Kissé az axilla közepe fölé irányul (az AC ízület fölé). A CS. vízszintes, kb. 10-30 fok latero-medialis döntéssel (mértéke a kar abdukciójától függ).
Beállítás (beteg elhelyezése):	<p>A Lawrence-féle beállításnál a beteg a hátán fekszik. A test középső sagittalis síkját az asztal középvonalához átlósan állítjuk, hogy az érintett váll a középvonalhoz közelebb legyen. Támasztékkal megemeljük a váll és a kar szintjét a kazetta megfelelő centrálásához. Az érintett kart 90 fokban abducaljuk. A fejet az érintett oldaltól elfordítjuk, hogy a kazettát oda tudjuk tenni. A kazettát az asztallapra merőlegesen megtámasztjuk úgy, hogy a kazetta hossz tengelye a kar hossz tengelyével legyen párhuzamos. A kazetta érintkezik a vállal, medialis vége a nyaknál van (így a kazetta közepére esik a sebési nyak). Expozíció alatt légzésszünet.</p> <p>Másik változatnál a beteg az asztal végénél oldalt ül, alkarja könyökben hajlítva az asztalon támaszkodik. Egyenes háttal, teljes testtel oldalra dől, fejét előre, kicsit az ellenoldal felé billenti. A 18x24 cm-es kazettát keresztben a hónaljárok alá helyezzük. A centrális sugár merőleges a filmre, a vállizületre céloz. Kb. 80 cm a FFT (ha szükséges, a csövet mediantól lateral felé 10 fokkal dönthetjük).</p>
Felvételi követelmény:	A caput humeri és a scapula cavitas glenoidalis inferioris superior vetületben ábrázolódjon. A caput és a collum humeri csaknem teljes oldalnézetben ábrázolódjon. Az acromioclavicularis ízület a caput humerire vetül.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.