

<b>OENO:</b>	
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	<b>Kivetített tüdőcsúcs felvétel (AP lordoticus tartás)</b>
<b>Indikáció:</b>	
<b>Blende határok:</b>	
<b>Anatómiai képletek:</b>	
<b>Képméret:</b>	24x30
<b>FFT:</b>	
<b>Centrális sugár:</b>	merőleges a film síkjára és a sternum közepén halad át
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A kazetta felső széle kb. 10 cm-rel legyen a vállak felett. A beteg háttal álljon az állványnak, attól kb. 30 cm-re. A kezeket tenyérrel kifelé fordítja, a csípőre helyezi és ívben hátrahajlik, a váll, a nyak, a fej érintse az állványt. Expozíció a második mély belégzést követő légzésszünetben.
<b>Felvételi követelmény:</b>	A tüdőcsúcsok jól ábrázolódnak a clavicula rávetülése nélkül. A gerincoszlop a felvétel középvonalában legyen, a sternum oldalnézetben ábrázolódjon. A hilusok vetüljenek a film közepére. A csúcsi és felső tüdőrészek is jól láthatóak legyenek.
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.