

<b>OENO:</b>	31750
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Os naviculare, négyirányú felvétel
<b>Indikáció:</b>	A kéztőcsont állapotának megítélése, rendszerint trauma után.
<b>Blende határok:</b>	
<b>Anatómiai képletek:</b>	radius és ulna distalis vége, carpusok, metacarpusok prox. vége
<b>Képméret:</b>	13x18 cm vagy 18x24 cm.
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	Merőleges a csuklóízület közepére.
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A kétirányú csukló felvételt ki kell egészíteni ún. „citera-” és „zászlótartásban” készült felvétellel. Dorso-volaris ferde felvétel (citera): a csukló és a kéz kifelé 45 fokkal elfordított. Dorso-volaris felvétel ulnarflexióban (zászló): az ujjakat a kisujj irányába maximálisan megfeszíti a beteg.
<b>Felvételi követelmény:</b>	
<b>Megjegyzés:</b>	Lényeges, hogy az ujjak behajlítva legyenek a dorso-volaris felvételnél, mert az os naviculare hossz tengelye nem vízszintes, hanem a tenyér felé ferdén halad, nyújtott ujjaknál nem ábrázolható. Oldaljelzés, gonádvédelem.