

A monitor rendszerben 2018. évben jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim	Colistin
<i>Acinetobacter baumannii</i>									
Érzékeny (%)	36,8	32,0	20,1	22,6	31,3	56,6	45,6	23,0	96,9
Mérsékelt (%)	2,0	4,4	-	0,2	-	-	3,0	0,3	0,0
Rezisztens (%)	61,2	63,6	79,9	77,2	68,7	43,4	51,4	76,7	3,1
Törzs (beteg)	3172	3217	3203	2226	3158	3098	2935	2339	1558
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus complex-be tartozó specierek (A. pittii, A. nosocomialis, A. calcoaceticus)</i>									
Érzékeny (%)	91,6	88,5	84,2	87,0	87,9	91,2	87,9	81,0	
Mérsékelt (%)	0,9	2,4	-	0,6	0,0	-	0,5	0,3	
Rezisztens (%)	7,5	9,1	15,8	12,4	12,1	8,8	11,6	18,7	
Törzs (beteg)	454	453	450	315	448	451	439	395	
<i>Acinetobacter egyéb</i>									
Érzékeny (%)	94,6	92,8	88,4	88,4	92,1	89,3	90,0	87,1	
Mérsékelt (%)	0,1	1,2	-	0,4	0,1	-	1,8	0,2	
Rezisztens (%)	5,3	6,0	11,6	11,2	7,8	10,7	8,2	12,7	
Törzs (beteg)	1351	1432	1446	959	1423	1426	1159	1210	