

A monitor rendszerben 2011. évben az *Enterococcus* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High Level)	Streptomycin (High Level)	Ciprofloxacin	Levofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Quinupristin\ dalifopristin	Linezolid
--------------	------------	-------------------------	---------------------------	---------------	--------------	------------	-------------	--------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>									
Érzékeny (%)	99,7	75,3	61,9	26,4	67,5	100,0	100,0	4,4	99,3
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	48,8	14,0	0,0	0,0	0,1	0,4
Rezisztens (%)	0,3	24,7	38,1	24,8	18,6	0,0	0,0	95,5	0,3
Törzs (beteg)	20218	20009	4197	14453	6970	19882	13395	2047	3840

<i>Enterococcus faecium</i>									
Érzékeny (%)	2,9	51,2	44,6	3,7	9,6	99,1	99,9	94,5	100,0
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	5,8	4,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	97,1	48,8	55,4	90,5	86,2	0,7	0,1	5,5	0,0
Törzs (beteg)	926	1190	489	516	334	1262	975	254	473