

Intenzív osztályokról jelentett *Acinetobacter spp.* törzsek antibiotikum érzékenysége 2007

Antibiotikum	Ampicillin/ sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/ Tazobac	Imipenem	Meropenem	Cefoperazon	Ceftazidim	Cefepime	Ciprofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Netilmicin	Amikacin	Sumetrolim
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	----------	-----------	-------------	------------	----------	---------------	------------	------------	------------	----------	------------

<i>Acinetobacter baumannii</i>														
Érzékeny (%)	85,3	5,4	24,4	84,8	77,9	2,0	10,4	18,1	12,6	28,2	51,1	59,4	61,1	20,2
Mérsékelt (%)	3,5	5,4	37,3	4,8	6,5	1,3	11,3	22,6	0,3	6,9	10,5	13,4	6,7	1,9
Rezisztens (%)	11,2	89,3	38,3	10,4	15,7	96,7	78,3	59,3	87,1	64,9	38,4	27,2	32,2	77,9
Törzs (beteg)	605	168	624	643	434	150	692	526	677	696	677	217	687	470

<i>Acinetobacter egyéb</i>														
Érzékeny (%)	73,7	43,8	47,6	71,4	60,7	37,9	41,3	47,7	41,6	53,1	66,2	73,9	62,2	48,1
Mérsékelt (%)	1,9	0,0	6,6	1,6	6,2	10,3	4,9	5,9	2,8	4,3	6,2	4,3	3,3	0,8
Rezisztens (%)	24,4	56,3	45,8	26,9	33,1	51,7	53,8	46,4	55,6	42,6	27,6	21,7	34,4	51,1
Törzs (beteg)	156	16	166	182	145	29	184	153	178	162	145	46	180	133