

*Staphylococcus aureus* törzsek antibiotikum érzékenysége 2007

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalphopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim
--------------	------------	-----------	---------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------------------------	-----------	-----------	------------

<i>Járóbeteg mintákból izolált törzsek</i>															
Érzékeny (%)	7,8	94,3	93,2	96,8	96,7	82,6	84,3	100,0	100,0	99,6	85,1	100,0	100,0	96,8	97,6
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,7	0,2	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2
Rezisztens (%)	92,2	5,7	6,2	3,0	2,6	17,2	15,5	0,0	0,0	0,3	14,7	0,0	0,0	3,1	2,2
Törzs (beteg)	17740	18299	13246	15804	6457	18155	18090	17274	7946	7525	12715	40	112	1186	17442

<i>Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek</i>															
Érzékeny (%)	7,0	79,9	77,6	92,2	89,6	73,0	75,0	99,99	99,99	96,9	87,8	100,0	100,0	91,7	96,7
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,7	0,3	1,8	0,1	0,2	0,01	0,01	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2
Rezisztens (%)	93,0	20,1	21,8	7,5	8,6	26,9	24,9	0,0	0,0	2,8	11,8	0,0	0,0	8,3	3,1
Törzs (beteg)	13764	14236	9649	12941	5173	14064	14028	13705	6031	5011	8916	99	341	1140	13284