

A monitor rendszerben 2016. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalbopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Érzékeny (%)	8,7	70,5	72,0	73,5	97,9	95,2	95,0	68,9	69,6	99,8	99,9	99,2	93,3	84,3	99,9	98,2	99,1	100,0	99,3
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	91,3	29,5	28,0	26,4	2,1	4,8	5,0	31,0	30,4	0,2	0,1	0,8	6,7	0,0	0,1	1,7	0,9	0,0	0,7
Törzs (beteg)	2446	3601	3390	3020	3864	2134	1817	3523	3861	1954	1162	2765	3101	172	1046	1729	3778	2370	276