

**A monitor rendszerben 2014. évben intenzív osztályokról jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége**

| Antibiotikum | Imipenem | Meropenem | Ciprofloxacin | Levofloxacin | Gentamicin | Tobramycin | Amikacin | Sumetrolim |
|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|------------|
|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|------------|

| <b><i>Acinetobacter baumannii</i></b> |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Érzékeny (%)                          | 27,8 | 23,5 | 6,6  | 7,0  | 16,8 | 31,3 | 21,1 | 12,3 |
| Mérsékelt (%)                         | 2,4  | 4,9  | -    | 0,1  | -    | -    | 2,9  | 0,3  |
| Rezisztens (%)                        | 69,7 | 71,6 | 93,4 | 92,9 | 83,2 | 68,7 | 76,0 | 87,4 |
| Törzs (beteg)                         | 1494 | 1463 | 1477 | 933  | 1479 | 1422 | 1449 | 1007 |

| <b><i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Érzékeny (%)                                                                                                                                               | 88,4 | 88,4 | 85,5 | 91,8 | 87,0 | 91,3 | 89,7 | 88,5 |
| Mérsékelt (%)                                                                                                                                              | 1,4  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Rezisztens (%)                                                                                                                                             | 10,1 | 11,6 | 14,5 | 8,2  | 13,0 | 8,7  | 10,3 | 11,5 |
| Törzs (beteg)                                                                                                                                              | 69   | 69   | 69   | 49   | 69   | 69   | 68   | 52   |

| <b><i>Acinetobacter egyéb</i></b> |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Érzékeny (%)                      | 65,0 | 57,7 | 49,1 | 49,8 | 57,1 | 61,2 | 54,7 | 55,8 |
| Mérsékelt (%)                     | 1,5  | 3,6  | 0,0  | 0,4  | -    | -    | 1,3  | 0,4  |
| Rezisztens (%)                    | 33,5 | 38,7 | 50,9 | 49,8 | 42,9 | 38,8 | 44,1 | 43,8 |
| Törzs (beteg)                     | 331  | 336  | 330  | 273  | 329  | 338  | 311  | 258  |