

**A monitor rendszerben 2013. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége**

| Antibiotikum   | Penicillin | Oxacillin | Ciprofloxacin | Moxifloxacin | Gentamicin | Tobramycin | Amikacin | Erythromycin | Clindamycin | Vancomycin | Teicoplanin | Rifampicin | Tetracyclin | Quinupristin/<br>dalbopristin | Linezolid | Mupirocin | Sumetrolim | Tigecyclin | Fusidic acid |
|----------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| Érzékeny (%)   | 9,0        | 72,9      | 71,8          | 72,2         | 95,7       | 88,9       | 89,0     | 70,1         | 71,3        | 100,0      | 100,0       | 98,7       | 91,9        | 93,6                          | 100,0     | 98,4      | 99,0       | 99,9       | 99,7         |
| Mérsékelt (%)  | 0,0        | 0,0       | 0,0           | 0,5          | 0,0        | 0,0        | 0,7      | 0,1          | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,1        | 0,2         | 6,4                           | 0,0       | 0,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| Rezisztens (%) | 91,0       | 27,1      | 28,2          | 27,3         | 4,3        | 11,1       | 10,3     | 29,8         | 28,7        | 0,0        | 0,0         | 1,2        | 7,9         | 0,0                           | 0,0       | 1,4       | 1,0        | 0,1        | 0,3          |
| Törzs (beteg)  | 1906       | 3096      | 2536          | 2911         | 3295       | 1859       | 1596     | 3416         | 3381        | 1928       | 1166        | 2299       | 2393        | 218                           | 445       | 1619      | 3274       | 1991       | 335          |