

A monitor rendszerben 2009. évben intenzív osztályról jelentett Enterococcus törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High level)	Streptomycin (High level)	Levofloxacin	Ciprofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Quinupristin\ dalbopristin	Linezolid
--------------	------------	----------------------------	------------------------------	--------------	---------------	------------	-------------	-------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>									
Érzékeny (%)	98,8	58,6	47,2	40,4	27,0	100,0	100,0	3,2	100,0
Mérsékelt (%)	0,0			18,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	1,2	41,4	52,8	41,6	37,5	0,0	0,0	96,8	0,0
Törzs (beteg)	772	686	284	361	403	858	577	157	180

<i>Enterococcus faecium</i>									
Érzékeny (%)	0,6	19,1	48,6	5,4	0,0	98,1	97,2	82,8	98,6
Mérsékelt (%)	0,0			0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	99,4	80,9	51,4	94,6	97,1	1,9	2,8	17,2	1,4
Törzs (beteg)	170	173	74	92	102	207	143	58	72