

A monitor rendszerben 2009 évben invazív mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacin	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Doxycyclin	Quinupristin\ dalfopristin	Linezolid	Sumetrolim
--------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------------------------	-----------	------------

Érzékeny (%)	8,4	71,4	67,5	75,5	90,9	82,2	65,0	66,9	99,7	100,0	97,6	89,1	92,2	100,0	100,0	94,9
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,7	1,6	0,7	2,8	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,1
Rezisztens (%)	91,6	28,6	31,8	22,9	8,4	15,0	34,6	32,7	0,0	0,0	2,4	10,1	7,4	0,0	0,0	5,0
Törzs (beteg)	1150	1200	1099	375	811	466	1198	1198	1193	788	331	477	230	64	251	1091