

A monitor rendszerben 2008. évben nem vizelet mintákból jelentett *Enterococcus* törzsek antibiotikum érzékenysége

| Antibiotikum | Ampicillin | Gentamicin | Streptomycin | Levofloxacin | Ciprofloxacin | Vancomycin | Teicoplanin | Quinupristin\<br>dalopristin | Linezolid |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|

| <i>Enterococcus faecalis</i> |       |      |      |      |      |       |       |       |      |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Érzékeny (%)                 | 99,5  | 73,0 | 74,6 | 66,1 | 29,4 | 100,0 | 100,0 |       | 99,6 |
| Mérsékelt (%)                | 0,0   |      |      | 18,4 | 47,8 | 0,0   | 0,0   |       | 0,1  |
| Rezisztens (%)               | 0,5   | 27,0 | 25,4 | 15,5 | 22,8 | 0,0   | 0,0   | 100,0 | 0,3  |
| Törzs (beteg)                | 10592 | 6671 | 1857 | 5992 | 6356 | 9843  | 6029  | 589   | 1467 |

| <i>Enterococcus faecium</i> |      |      |      |      |      |      |       |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Érzékeny (%)                | 8,7  | 37,3 | 44,9 | 14,2 | 3,3  | 99,2 | 100,0 | 52,9 | 96,4 |
| Mérsékelt (%)               | 0,2  |      |      | 2,2  | 5,8  | 0,0  | 0,0   | 1,2  | 0,0  |
| Rezisztens (%)              | 91,1 | 62,7 | 55,1 | 83,6 | 90,9 | 0,8  | 0,0   | 45,9 | 3,6  |
| Törzs (beteg)               | 439  | 370  | 118  | 268  | 243  | 476  | 282   | 85   | 112  |