

A monitor rendszerben 2008. évben vizelet mintákból jelentett Enterococcus törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin	Streptomycin	Levofloxacin	Ciprofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Nitrofurantoin	Norfloxacín	Tetracyclin	Quinupristin\ dalbopristin	Linezolid
--------------	------------	------------	--------------	--------------	---------------	------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------

Enterococcus faecalis

Érzékeny (%)	99,0	69,1	62,1	73,6	39,4	100,0	100,0	98,3	43,1	12,0		100,0
Mérsékelt (%)	0,1			2,7	32,4	0,0	0,0	0,6	30,5	6,9		0,0
Rezisztens (%)	0,9	30,8	37,9	23,7	28,2	0,0	0,0	1,2	26,4	81,1	100,0	0,0
Törzs (beteg)	8171	4437	737	4554	7987	7171	2480	7673	4438	3434	169	288

Enterococcus faecium

Érzékeny (%)	6,3	56,3	48,9	22,7	15,7	97,7	97,2	61,7	18,3	49,3	30,0	100,0
Mérsékelt (%)	0,6			5,5	8,5	0,0	0,0	8,7	4,2	1,4	20,0	0,0
Rezisztens (%)	93,2	43,7	51,1	71,9	75,8	2,3	2,8	29,5	77,5	49,3	50,0	0,0
Törzs (beteg)	176	135	47	128	153	173	107	149	71	69	10	27