

**A monitor rendszerben 2019. évben nem vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<b><i>Acinetobacter baumannii</i></b>								
Érzékeny (%)	29,5	25,1	-	21,3	29,2	56,0	37,8	22,5
Maximális dózisa érzékeny (%)	1,0	2,7	15,8	0,1	-	-	-	0,2
Rezisztens (%)	69,5	72,2	84,2	78,6	70,8	44,0	62,2	77,3
Törzs (beteg)	3336	3365	3237	2145	3360	3291	3176	2229
<b><i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó speciestek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)</b>								
Érzékeny (%)	88,7	82,1	-	86,2	85,7	88,1	88,2	76,3
Maximális dózisa érzékeny (%)	0,0	3,6	63,2	0,8	0,0	0,0	-	0,0
Rezisztens (%)	11,3	14,3	36,8	13,0	14,3	11,9	11,8	23,7
Törzs (beteg)	388	391	375	239	392	385	381	333
<b><i>Acinetobacter egyéb</i></b>								
Érzékeny (%)	96,6	95,5	-	90,2	94,6	92,0	92,5	89,2
Maximális dózisa érzékeny (%)	0,1	1,3	74,8	1,1	0,0	-	-	0,1
Rezisztens (%)	3,3	3,2	25,2	8,7	5,4	8,0	7,5	10,7
Törzs (beteg)	1342	1430	1223	1008	1435	1418	1187	1239