

**A monitor rendszerben 2020. évben nem vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<b><i>Acinetobacter baumannii</i></b>								
Érzékeny (%)	21,8	17,9	-	13,8	20,9	51,4	31,6	17,4
Maximális dózisa érzékeny (%)	0,9	1,8	11,4	0,0	0,0	-	-	0,2
Rezisztens (%)	77,3	80,3	88,6	86,2	79,1	48,6	68,4	82,4
Törzs (beteg)	3222	3246	3064	2555	3227	3143	3098	2099
<b><i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specierek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)</b>								
Érzékeny (%)	92,1	85,8	-	81,4	87,3	90,3	91,4	82,3
Maximális dózisa érzékeny (%)	0,0	3,3	73,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5
Rezisztens (%)	7,9	10,9	26,2	18,0	12,7	9,7	8,6	17,2
Törzs (beteg)	239	239	237	161	237	238	233	198
<b><i>Acinetobacter egyéb</i></b>								
Érzékeny (%)	97,0	94,5	-	91,5	95,3	92,3	94,3	86,9
Maximális dózisa érzékeny (%)	0,0	1,8	86,3	1,1	-	-	-	0,3
Rezisztens (%)	3,0	3,7	13,7	7,4	4,7	7,7	5,7	12,8
Törzs (beteg)	1192	1247	1153	853	1251	1244	1096	1109