

A monitor rendszerben 2020. évben vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	34,5	25,2	-	15,4	31,4	50,7	37,1	19,2
Maximális dóziszra érzékeny (%)	3,2	2,8	13,0	0,0	-	-	0,0	0,4
Rezisztens (%)	62,3	72,0	87,0	84,6	68,6	49,3	62,9	80,4
Törzs (beteg)	308	322	301	254	322	306	299	214
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	95,3	86,0	-	74,2	88,6	88,4	92,1	76,3
Maximális dóziszra érzékeny (%)	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	4,7	14,0	28,5	25,8	11,4	11,6	7,9	23,7
Törzs (beteg)	43	43	42	31	44	43	38	38
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	96,8	96,0	-	90,9	96,8	97,7	97,3	88,5
Maximális dóziszra érzékeny (%)	0,0	0,4	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	3,2	3,6	19,2	9,1	3,2	2,3	2,7	11,5
Törzs (beteg)	218	224	213	154	222	213	185	200