

A monitor rendszerben 2020. évben invazív mintákból jelentett coagulase-negatív Staphylococcus izolátumok antibiotikum érzékenysége

| Antibiotikum | Penicillin | Oxacillin | Ciprofloxacín | Moxifloxacin | Gentamicin | Tobramycin | Amikacin | Erythromycin | Clindamycin | Vancomycin | Teicoplanin | Rifampicin | Tetracyclin | Linezolid | Sumetrolim |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Érzékeny (%) | 2,2 | 34,7 | - | 43,9 | 56,3 | 44,1 | 43,5 | 28,3 | 36,0 | 99,9 | 97,5 | 87,2 | 73,3 | 99,8 | 47,6 |
| Maximális dózisa érzékeny (%) | 0,0 | 0,0 | 43,9 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Rezisztens (%) | 97,8 | 65,3 | 56,1 | 56,1 | 43,7 | 55,9 | 56,5 | 71,7 | 63,9 | 0,1 | 2,5 | 12,8 | 26,5 | 0,2 | 52,2 |
| Törzs (beteg) | 3185 | 8744 | 7738 | 7129 | 8936 | 5777 | 4334 | 8282 | 7851 | 5784 | 2723 | 5158 | 5225 | 1917 | 7451 |