

A monitor rendszerben 2018. évben invazív mintákból jelentett coagulase-negatív Staphylococcus izolátumok antibiotikum érzékenysége

| Antibiotikum | Penicillin | Oxacillin | Ciprofloxacín | Moxifloxacin | Gentamicin | Tobramycin | Amikacin | Erythromycin | Clindamycin | Vancomycin | Teicoplanin | Rifampicin | Tetracyclin | Linezolid | Sumetrolim |
|----------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Érzékeny (%) | 3,3 | 35,1 | 45,4 | 44,6 | 57,0 | 45,4 | 43,6 | 29,7 | 37,2 | 99,9 | 91,6 | 89,7 | 70,9 | 99,6 | 49,5 |
| Mérsékelt (%) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| Rezisztens (%) | 96,7 | 64,9 | 54,6 | 55,4 | 43,0 | 54,6 | 55,9 | 70,3 | 62,7 | 0,1 | 8,4 | 9,8 | 28,9 | 0,4 | 50,2 |
| Törzs (beteg) | 3822 | 7804 | 6782 | 6265 | 7965 | 4826 | 3788 | 7326 | 8054 | 5371 | 2514 | 4685 | 5021 | 1812 | 6645 |