

A monitor rendszerben 2017. évben intenzív osztályokról jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	19,7	17,4	11,5	14,5	19,0	55,6	37,9	13,4
Mérsékelt (%)	0,8	2,4	0,0	0,2	-	-	0,0	0,5
Rezisztens (%)	79,5	80,2	88,5	85,3	81,0	44,4	62,1	86,1
Törzs (beteg)	1337	1351	1342	795	1350	1337	1306	873
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó speciosek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	75,0	72,6	61,9	84,3	67,9	77,4	71,4	61,8
Mérsékelt (%)	2,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
Rezisztens (%)	22,6	23,8	38,1	15,7	32,1	22,6	26,2	38,2
Törzs (beteg)	84	84	84	51	84	84	84	76
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	81,4	73,2	66,0	62,1	78,5	82,7	70,3	71,7
Mérsékelt (%)	1,9	5,5	0,0	0,0	-	0,0	1,9	0,0
Rezisztens (%)	16,7	21,3	34,0	37,9	21,5	17,3	27,8	28,3
Törzs (beteg)	156	164	159	124	163	162	158	127