

**A monitor rendszerben 2017. évben jelentett *Neisseria meningitidis* és
Moraxella catharralis izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Penicillin	Ceftriaxon	Meropenem	Rifampicin	Ciprofloxacín
--------------	------------	------------	-----------	------------	---------------

Neisseria meningitidis

MIC ₅₀ (mg/L)	0,125	0,002	0,016	0,016	0,004
MIC ₉₀ (mg/L)	0,5	0,016	0,064	0,032	0,008
MIC tartomány (mg/L)	0,016-2,0	0,002-0,032	0,002-0,125	0,004-0,032	0,002-0,016
Érzékeny (%)	49,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mérsékelt (%)	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Törzs (beteg)	49	41	25	14	43

Antibiotikum	Amoxicillin/ clav.sav	Cefixim	Levofloxacin	Moxifloxacin	Erythromycin	Tetracyclin	Sumetrolim
--------------	--------------------------	---------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------

Moraxella catharralis

Érzékeny (%)	98,9	99,6	99,3	99,4	88,7	99,1	83,3
Mérsékelt (%)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	1,1
Rezisztens (%)	1,1	0,3	0,7	0,6	10,9	0,9	15,6
Törzs (beteg)	2712	2210	2210	2187	1671	2402	2263