

A monitor rendszerben 2017. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ndalfopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Érzékeny (%)	9,3	73,0	74,7	75,3	97,9	94,6	94,7	71,2	70,8	100,0	100,0	98,6	92,2	84,3	100,0	99,1	99,2	100,0	100,0
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	90,7	27,0	25,2	24,6	2,1	5,4	5,3	28,7	29,1	0,0	0,0	1,3	7,8	0,4	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0
Törzs (beteg)	2472	3806	3534	3240	4129	2500	2183	3481	4121	1901	1145	3007	3339	229	1256	1908	4041	2594	445